

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «АмоксиБАГ LC»

1. Торговое наименование.
АмоксиБАГ LC.

2. Международное непатентованное наименование.
Амоксициллин (amoxicillin), клавулановая кислота (clavulanic acid), преднизолон (prednisolone).

3. Регистрационный номер.
7536-10-21 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Суспензия для интрацестерального введения.
По внешнему виду препарат представляет суспензию от светло-желтого до темно-желтого цвета.

5. Состав.
В одном шприце (3 г) в качестве действующих веществ содержится 200 мг амоксициллина (в форме амоксициллина тригидрата), 50 мг клавулановой кислоты (в форме калия клавуланата), 10 мг преднизолона, в качестве вспомогательных веществ – церезин, парафин твердый, цетостеариловый спирт, полисорбат 60, цеолит, парафин жидкий.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Пенициллины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты, действующих веществ препарата, усиливает действие друг друга и обеспечивает широкий спектр антимикробной активности препарата в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Actinomyces bovis*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus spp.* и др.).

Амоксициллин является полусинтетическим антибиотиком группы пенициллинов, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Механизм его действия заключается в ингибировании фермента транспептидазы, что ведет к нарушению синтеза пептидогликана (опорный белок) клеточной стенки в период деления и роста микроорганизма, вызывая тем самым лизис бактериальной клетки.

Клавулановая кислота необратимо связывает β -лактамазу (образует с ней стабильный комплекс), защищая амоксициллин от ферментативного разрушения и восстанавливая чувствительность бактерий к бактерицидному действию амоксициллина.

Преднизолон обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием, уменьшает отек и воспаление, не оказывает отрицательного воздействия на активность лейкоцитов в очаге воспаления, улучшает проникновение антибиотиков в ткани.

После интрацестерального введения препарата амоксициллин, клавулановая кислота и преднизолон всасываются в системный кровоток в незначительной степени, выводятся из организма с молоком, а также в незначительном количестве – с мочой и фекалиями.

8. Показания к применению.
Препарат применяют коровам при мастите бактериальной этиологии в период лактации.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят интрацестернально коровам в дозе 3 г (1 шприц) в каждую пораженную долю вымени трехкратно с интервалом 12 часов.

Перед применением препарата из пораженных долей вымени выдаивают содержимое, соски обрабатывают антисептическим средством (очищающей салфеткой), разрешенным для этих целей, затем в канал соска вводят канюлю шприца и осторожно выдавливают содержимое. После введения препарата канюлю шприца извлекают, верхушку соска пережимают пальцами на 1–2 минуты и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения препарата.

Перед введением препарат рекомендуется подогреть до температуры тела животного.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

Симптомы передозировки при применении препарата у животных не выявлены.

13. Беременность и период лактации.

Препарат применяют в период лактации. Применение препарата стельным коровам не противопоказано.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают, назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Применение препарата не исключает использование других лекарственных препаратов, за исключением препаратов для интрацестернального введения.

17. Форма выпуска.

Пластиковые шприцы по 3 г, закрытые колпачками.

18. Срок годности.

18 месяцев с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Молоко лактирующих животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 72 часа после последнего введения препарата.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 7 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 35 от 04.06.2026