

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Амоксициллин-800»

1. Торговое наименование.

Амоксициллин-800.

2. Международное непатентованное наименование.

Амоксициллин (amoxicillin).

3. Регистрационный номер.

6833-10-19 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Порошок для приема внутрь и приготовления раствора для приема внутрь.

По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до бело-желтого цвета.

5. Состав.

В 1 г препарата в качестве действующего вещества содержится 800 мг амоксициллина тригидрата, в качестве вспомогательных веществ – натрия карбонат, натрия цитрат, кремния диоксид.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Пенициллины.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Амоксициллин, действующее вещество препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, эффективен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Proteus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Actinomyces spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella spp.* и других микроорганизмов, за исключением штаммов, продуцирующих β -лактамазу.

Механизм действия амоксициллина заключается в нарушении синтеза клеточной стенки бактерий путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.

Амоксициллин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани животного. В максимальных концентрациях антибиотик накапливается в крови (через 1–2 часа после введения препарата), легких и бронхопульмональном секрете. Выводится из организма преимущественно с мочой и в незначительном количестве с желчью.

8. Показания к применению.

Препарат применяют для лечения телят, свиней и цыплят-бройлеров при заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к амоксициллину. Препарат высокоэффективен в качестве терапевтического средства при пастереллезе, сальмонеллезе, клостридиозе, эшерихиозе (колибактериозе), инфекционном атрофическом рините и роже свиней.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к пенициллинам и цефалоспорином, а также при нарушении выделительной функции почек. Запрещено применение препарата ремонтному молодняку кур-несушек менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, а также жвачным животным с развитыми преджелудками.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют животным и птице внутри индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

- телятам с водой или в смеси с кормом – 10–15 мг препарата на 1 кг массы тела животного 2 раза в сутки в течение 3–5 суток подряд;
- свиньям – при индивидуальном способе применения с кормом или водой – 20 мг препарата на 1 кг массы тела животного 1 раз в сутки в течение 3–5 суток. При групповом способе применения лечебных растворов рекомендуется использовать следующие соотношения:
- пороссятам до 4-месячного возраста – 20 г препарата на 100 л воды или 250–375 г препарата на 1 т корма в течение 3–5 суток подряд;
- свиньям старше 4-месячного возраста – 30 г препарата на 100 л воды или 375 г препарата на 1 т корма в течение 3–5 суток подряд.

Для птицы рекомендованная суточная доза составляет 10–20 мг препарата на 1 кг массы тела птицы. Лечение проводят в течение 3–5 суток. Для приготовления лечебных растворов рекомендуется использовать следующие соотношения:

- птице до 4 недель жизни – 6–12 г препарата на 100 л воды;
- птице старше 4 недель жизни – 10–20 г препарата на 100 л воды.

Лечебный раствор следует готовить ежедневно.

В период применения препарата приготовленный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для животных и птицы.

Необходимо учитывать, что максимальная растворимость препарата в воде составляет 6 г/л. При низких температурах (2–8 °С) растворимость препарата снижается до 3–5 г/л. При приготовлении концентрата для выпаивания или раздачи с помощью медикатора/дозатора рекомендуется готовить раствор препарата с концентрацией не более 3 г/л, а затем раздавать его с учетом необходимых доз.

После окончания выпаивания лечебного раствора животным и птице необходимо промыть все емкости и трубопроводы.

Препарат термостабилен, не теряет своих свойств в процессе термической обработки при температуре 100 °С.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных и птицы могут наблюдаться рвота и диарея. В этом случае препарат отменяют и при необходимости назначают симптоматические средства.

13. Беременность и период лактации.

Возможность применения препарата во время беременности и лактации определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным и птице, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций (кожная сыпь, эритема, зуд), у поросят – отек прямой кишки, при длительном применении – дисбактериоз. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается совместное применение препарата с антибиотиками групп тетрациклинов, макролидов, линкозамидов, амфениколов и сульфаниламидами.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полимерной пленки по 1 кг и мешки бумажные многослойные с полиэтиленовым покрытием (вкладышем) по 25 кг.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В упаковке изготовителя в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия упаковки – 3 месяца при соблюдении условий хранения. Приготовленный раствор препарата годен в течение 24 часов.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 15 суток, птицы не ранее чем через 1 сутки после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Запрещается применение препарата птице, яйца которой предназначены в пищу людям.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адрес производственной площадки:

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/3; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2026г