

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Дектоmekтин»

1. Торговое наименование.
Дектоmekтин.

2. Международное непатентованное наименование.
Дорамектин (doramectin).

3. Регистрационный номер.
8988-10-24 БСПА.

4. Лекарственная форма и описание.
Раствор для внутримышечного и подкожного введения.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета.

5. Состав.
В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 10 мг дорамектина, в качестве вспомогательных веществ – этилолеат, кунжутное масло, бутилгидроксанизол.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Макроциклические лактоны.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Дорамектин обладает широким спектром противопаразитарного действия, оказывает губительное влияние на нематод (*Oesophagostomum spp.*, *Ostertagia spp.* (включая инкапсулированные личинки), *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Bunostomum spp.*, *Strongyloides spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Thelazia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Trichuris (Trichocephalus) spp.*, *Metastrongylus spp.*, *Parafilaria bovicola*, *Ascaris suum* и другие); личинки подкожных и носоглоточных оводов родов *Hypoderma* и *Oestrus*; власоедов и вшей родов *Bovicola*, *Haematopinus*, *Linognathus* и *Solenopotes*; чесоточных клещей родов *Psoroptes* и *Sarcoptes*; иксодовых клещей (*Rhipicephalus microplus*) и других.

Дорамектин, связываясь с рецепторами клеток мышечной и нервной тканей паразитов, увеличивает проницаемость мембран для ионов хлора, что приводит к блокаде электрической активности нервных и мышечных клеток нематод и членистоногих, их параличу и гибели.

Дорамектин легко резорбируется из места инъекции. Фармакокинетические свойства дорамектина обеспечивают длительное сохранение терапевтических концентраций препарата в крови животных и защиту их от паразитарных заболеваний и реинвазии в течение длительного времени (до 28 суток). Выводится дорамектин из организма животных преимущественно с фекалиями, у лактирующих животных частично с молоком.

Препарат в рекомендуемых дозах не обладает мутагенным, тератогенным и эмбриотоксическим действиями.

8. Показания к применению.

Препарат назначают с лечебно-профилактической целью крупному рогатому скоту, овцам и свиньям при заболеваниях, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами, чувствительными к дорамектину.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят животным однократно в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту и овцам внутримышечно (в среднюю треть шеи) или подкожно (в область шеи или лопатки) в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела животного, что соответствует 0,2 мг дорамектина на 1 кг массы тела животного;

- свиньям внутримышечно (в область шеи за ухом) в дозе 1 мл препарата на 33 кг массы тела животного, что соответствует 0,3 мг дорамектина на 1 кг массы тела животного.

Препарат следует вводить медленно, предварительно подогрев до температуры тела животного.

Перед массовой обработкой животных каждую партию препарата проверяют на небольшой группе животных (7–10 голов) разного возраста и упитанности. При отсутствии признаков побочного действия препарата в течение трех суток после введения препарата приступают к обработке всего поголовья.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных могут наблюдаться слабость, тремор, усиленная саливация. Специфические средства детоксикации отсутствуют, применяют общие меры, направленные на выведение препарата из организма.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применять препарат коровам и овцам за две недели до родов и в течение всего периода лактации.

14. Особые указания.

Запрещается применять препарат истощенным и больным острыми инфекционными болезнями животным.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства и проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не рекомендуется применять препарат одновременно с лекарственными препаратами, содержащими макроциклические лактоны, вследствие возможного усиления токсического действия.

17. Форма выпуска.

Флаконы из бесцветного или темного стекла по 100, 250 и 500 мл.

18. Срок годности.

3 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона – 28 суток при соблюдении условий хранения.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой крупного рогатого скота и овец на мясо разрешается не ранее чем через 70 суток, свиней – через 77 суток после последнего применения препарата. При вынужденном убое животных ранее указанных сроков внутренние органы подлежат уничтожению, а мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Запрещается применение препарата продуктивным животным, чье молоко используется в пищу людям.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 59 от 11.08.2026