

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Канамикан-П»

1. Торговое наименование.

Канамикан-П.

2. Международное непатентованное наименование.

Канамицин (kanamycin), бензилпенициллина прокаин (benzylpenicillin procaine), преднизолон (prednisolone).

3. Регистрационный номер.

7712-10-21 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Суспензия для интрацистернального введения.

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до желтого цвета.

5. Состав.

В одном шприце (10 г) в качестве действующих веществ содержится 100 000 МЕ канамицина (в форме канамицина сульфата, эквивалентно 133 мг канамицина сульфата), 300 000 МЕ бензилпенициллина прокаина (эквивалентно 288 мг), 20 мг преднизолона, в качестве вспомогательных веществ – парафин твердый, церезин, цетостеариловый спирт, полисорбат 60, парафин жидкий.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Пенициллины в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Канамицин, действующее вещество препарата, является антибиотиком группы аминогликозидов, оказывает бактерицидное действие на многие грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, включая *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Campylobacter spp.* и другие. Менее активен в отношении стрептококков и грамотрицательных кокков. Резистентность микроорганизмов к канамицину развивается медленно и в небольшой степени.

Механизм бактерицидного действия канамицина обусловлен связыванием антибиотика с 30S-субъединицей бактериальных рибосом и угнетением синтеза белка возбудителя.

Бензилпенициллина прокаин, действующее вещество препарата, является антибиотиком группы пенициллинов длительного действия. Обладает узким спектром бактерицидного действия, с преимущественным влиянием на грамположительные микроорганизмы, такие как: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.* и др.

Механизм бактерицидного действия бензилпенициллина прокаина обусловлен нарушением синтеза составной части мукопептида – ацетилмурамовой кислоты, необходимой для построения стенки бактериальной клетки.

Преднизолон, действующее вещество препарата, обладает противовоспалительным и противоаллергическим действием, уменьшает отек и воспаление, не оказывает отрицательного воздействия на активность лейкоцитов в очаге воспаления, улучшает проникновение антибиотиков в ткани.

После интрацистернального введения препарата действующие вещества быстро распределяются по всей молочной железе и всасываются в кровь в незначительной степени. Действующие вещества препарата выводятся из организма в основном с мочой, частично с желчью.

8. Показания к применению.

Препарат применяют для лечения коров, коз и овец при остром мастите в период лактации.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Перед применением препарата из пораженных долей вымени выдаивают содержимое, кожу сосков вымени обрабатывают антисептическим средством (очищающей салфеткой), разрешенным для этих целей, затем в канал соска вводят наконечник шприца и осторожно выдавливают содержимое. Перед применением препарат рекомендуется подогреть до температуры тела животного.

Препарат вводят интрацистернально коровам в дозе 10 г (1 шприц), козам и овцам – в дозе 5 г (1/2 шприца) в каждую пораженную долю вымени с интервалом 12–24 часа, 3–6 введений в зависимости от тяжести воспалительного процесса. После введения препарата наконечник шприца извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и слегка массируют сосок снизу вверх для лучшего распределения препарата. Интервал между введением препарата и последующим сдаиванием должен составлять не менее 6 часов.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

Симптомы передозировки при применении препарата у животных не выявлены.

13. Беременность и период лактации.

Препарат применяют в период лактации. Применение препарата беременным животным не противопоказано.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. При пропуске введения препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Противопоказано совместное применение препарата с макролидами, тетрациклинами, полимиксинами и линкозамидами.

17. Форма выпуска.

Пластиковые шприцы по 10 г, закрытые колпачками.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 4 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Использование молока в пищу людям разрешается не ранее чем через 3 суток после последнего применения препарата при условии полного клинического выздоровления. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано в корм животным после кипячения.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 67 от 02.09.2026г.