

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Меглуфлор»

1. Торговое наименование.

Меглуфлор.

2. Международное непатентованное наименование.

Флорфеникол (florfenicol), флуниксин (flunixin).

3. Регистрационный номер.

7400-10-20 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Раствор для внутримышечного и подкожного введения.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета.

5. Состав.

В 1 мл препарата в качестве действующих веществ содержится 300 мг флорфеникола, 27,5 мг флуниксина меглумина, в качестве вспомогательных веществ – макрогол 400, пропиленгликоль, лимонная кислота, метилпириролидон.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Амфениколы в комбинациях.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Флорфеникол, входящий в состав препарата, представляет собой синтетический антибиотик группы фениколов, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа заменена атомом фтора. Механизм действия флорфеникола заключается в связывании с рибосомной субъединицей 50S в протоплазме бактериальной клетки и блокировании фермента пептидилтрансферазы, что приводит к торможению синтеза белка у бактерий на уровне рибосом.

Флорфеникол активен в отношении бактерий, которые производят ацетилтрансферазу.

Бактерицидно действует в отношении большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Salmonella spp.*, *Moraxella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.* и другие.

Также флорфеникол активен в отношении большинства микоплазм (*Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis* и другие).

При парентеральном введении препарата флорфеникол быстро всасывается, проникая во все органы и ткани. Максимальная концентрация антибиотика в крови достигается через 3,3 часа, а терапевтическая концентрация в органах и тканях животных сохраняется в течение 48 часов. Выводится из организма в неизменном виде и в виде метаболитов, преимущественно с мочой и частично с фекалиями.

Флуниксин, входящий в состав препарата, представляет собой нестероидное противовоспалительное средство с выраженными анальгетическим и жаропонижающим эффектами. Флуниксин является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), снижающим выработку простагландинов E₂. Снижение выработки медиаторов воспаления обуславливает анальгетический, жаропонижающий и противовоспалительный эффект флуниксина.

При парентеральном введении препарата флуниксин быстро всасывается и проникает во все органы и ткани. Максимальная концентрация в крови достигается через 1,3 часа, а терапевтическая концентрация в органах и тканях животных сохраняется в течение 48 часов. Флуниксин на 99 % связывается с белками плазмы и выводится из организма животных с фекалиями (57 %) и мочой (34 %).

8. Показания к применению.

Препарат назначают крупному рогатому скоту и свиньям при заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу, и вторичных бактериальных инфекциях.

Свиньям препарат применяют при инфекциях органов дыхания, в том числе плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae* и/или *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis* и атрофическом рините.

Крупному рогатому скоту препарат применяют при инфекциях органов дыхания, вызванных *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus somnus*, а также при поражениях копыт (копытная гниль, острый межпальцевый некробациллез, инфекционный пододерматит) и инфекционном кератоконъюнктивите, вызванном *Moraxella bovis*.

9. Противопоказания.

Препарат запрещается применять животным, которые имеют повышенную индивидуальную чувствительность к компонентам препарата, а также животным с заболеваниями сердца, печени или почек, при сильном обезвоживании, риске желудочно-кишечного отравления.

10. Способ применения и дозы.

Препарат назначают крупному рогатому скоту однократно подкожно в область шеи в дозе 2 мл препарата на 15 кг массы тела животного (что соответствует 40 мг флорфеникола и 2,2 мг флуниксина на 1 кг массы тела животного). Возможно двукратное внутримышечное введение препарата с интервалом 48 часов в дозе 1 мл препарата на 15 кг массы тела животного (что соответствует 20 мг флорфеникола и 1,1 мг флуниксина на 1 кг массы тела животного).

Свиньям препарат вводят внутримышечно в область шеи в дозе 1 мл препарата на 20 кг массы тела животного (что соответствует 15 мг флорфеникола и 0,825 мг флуниксина на 1 кг массы тела животного) двукратно с интервалом 48 часов.

Вводимое в одно место количество препарата не должно превышать 10 мл в связи с возможной выраженной болевой реакцией. Инъекцию следует проводить только в область шеи. Не допускается применение заниженных доз в связи со снижением терапевтической эффективности препарата.

При необходимости перед применением препарата допускается его подогрев до температуры тела животного.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных могут наблюдаться угнетенное состояние, снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря веса.

13. Беременность и период лактации.

Не допускается применение стельным коровам, супоросным свиноматкам, а также быкам и хрякам, используемым для воспроизводства.

14. Особые указания.

Без особых указаний.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В некоторых случаях на месте инъекции возможно появление местной воспалительной реакции, которая самопроизвольно исчезает без применения терапевтических средств.


При возникновении аллергических реакций препарат следует отменить, назначить антигистаминные средства и препараты кальция; обильное выпаивание 2-процентным раствором натрия гидрокарбоната.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Противопоказано совместное применение препарата с тиамфениколом, антибиотиками групп пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов, совместно с другими нестероидными противовоспалительными средствами и кортикостероидными препаратами в связи с повышением риска язвообразования в желудочно-кишечном тракте животных. Запрещено смешивание в одном шприце с другими препаратами.

17. Форма выпуска.

Флаконы из темного стекла по 100 мл.



18. Срок годности.

3 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона – 28 суток при соблюдении условий хранения.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой свиней и крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 46 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Препарат запрещен к применению продуктивным животным (крупный рогатый скот), чье молоко используют в пищу людям.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1;
+375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен»,
Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный
парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 30 от 14.05.2026г.