

ИНСТРУКЦИЯ **по применению ветеринарного лекарственного препарата «Рецефур ПС-200»**

1. Торговое наименование.
Рецефур ПС-200.

2. Международное непатентованное наименование.
Цефтиофур (ceftiofur).

3. Регистрационный номер.
7393-10-20 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Суспензия для внутримышечного и подкожного введения.
По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от белого до желтого цвета.

5. Состав.
В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 200 мг цефтиофура (в форме свободной кристаллической цефтиофуровой кислоты), в качестве вспомогательных веществ – хлопковое масло, среднецепочечные триглицериды.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Цефалоспорины.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Цефтиофур, действующее вещество препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: *Streptococcus spp.*, *Actinomyces pyogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Klebsiella spp.*, *Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Bacillus spp.*, *Proteus spp.*, *Fusobacterium necrophorum* и *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*), включая штаммы, продуцирующие лактамазу.

Механизм действия цефтиофура заключается в ингибировании фермента транспептидазы и нарушении синтеза пептидогликана – мукопептида клеточной оболочки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки микроорганизма и лизису бактерий.

После введения препарата цефтиофур подвергается метаболизму с образованием десфуоилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении бактерий. Активный метаболит обратимо связывается с белками плазмы крови и концентрируется в пораженных возбудителем тканях. Максимальная концентрация цефтиофура и его метаболитов в крови достигается через 12 часов и удерживается на терапевтическом уровне не менее 7 суток с момента введения препарата, при этом активность препарата не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой.

8. Показания к применению.

Препарат применяют крупному рогатому скоту при респираторных и желудочно-кишечных болезнях, некробактериозе, сепсисе, пиелонефрите, артрите, послеродовом эндометрите, метрите, мастите; свиньям при респираторных и желудочно-кишечных болезнях, синдроме метрит-мастит-агалактия; крупному рогатому скоту и свиньям с другими болезнями, вызванными микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к β -лактамным антибиотикам. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют:

- крупному рогатому скоту однократно подкожно у основания уха в дозе 1 мл препарата на 30 кг массы тела животного, что соответствует 6,67 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного. Рекомендуется вводить не более 20 мл препарата в одно место инъекции;

- свиньям однократно внутримышечно в дозе 0,5 мл препарата на 20 кг массы тела животного, что соответствует 5 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного. Рекомендуется вводить не более 4 мл препарата в одно место инъекции.

Перед применением флакон с препаратом следует взбалтывать до получения однородной суспензии.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

Симптомы передозировки при применении препарата у животных не установлены.

13. Беременность и период лактации.

Препарат можно применять во время беременности и лактации под наблюдением ветеринарного врача.

14. Особые указания.

Без особых указаний.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях у крупного рогатого скота возможно образование припухлости в месте введения, которая самопроизвольно исчезает; у свиней возможно образование припухлости и зоны алопеции в месте введения, которые самопроизвольно исчезают в течение 55 суток.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Препарат не следует назначать совместно с тетрациклинами, макролидами и линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

17. Форма выпуска.

Флаконы из темного стекла по 100 мл.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона – 28 суток при соблюдении условий хранения.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 20 суток, свиней – не ранее чем через 71 сутки после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Молоко коров можно использовать в пищевых целях без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 41 от 17.06.2026