

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Рецефур»

1. Торговое наименование.

Рецефур.

2. Международное непатентованное наименование.

Цефтиофур (ceftiofur).

3. Регистрационный номер.

8752-10-23 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Суспензия для внутримышечного и подкожного введения.

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до коричневого цвета.

5. Состав.

В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 50 мг цефтиофура (в форме цефтиофура гидрохлорида), в качестве вспомогательных веществ – алюминия стеарат, среднецепочечные триглицериды.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Цефалоспорины.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Цефтиофур, входящий в состав препарата, обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе: *Streptococcus spp.*, *Trueperella (Actinomyces) pyogenes*, *Staphylococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni (Haemophilus somnus)*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Klebsiella spp.*, *Citrobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Bacillus spp.*, *Proteus spp.*, *Fusobacterium necrophorum* и *Bacteroides melaninogenicus (Prevotella melaninogenica)*, включая штаммы, продуцирующие лактаму.

Механизм действия цефтиофура заключается в ингибировании фермента транспептидазы и нарушении синтеза пептидогликана – мукопептида (муреина) клеточной оболочки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки микроорганизма и лизису бактерий.

После введения препарата цефтиофур быстро подвергается метаболизму с образованием десфуроилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении бактерий. Активный метаболит обратимо связывается с белками плазмы крови и концентрируется в пораженных возбудителем тканях. Максимальная концентрация цефтиофура и его метаболитов в крови достигается через 0,5–2 часа и удерживается на терапевтическом уровне до 24 часов с момента введения препарата, при этом активность препарата не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой.

8. Показания к применению.

Препарат применяют для лечения крупного рогатого скота, овец, коз и свиней при респираторных и желудочно-кишечных болезнях; при некробактериозе крупного рогатого скота и овец; при сепсисе, пиелонефрите, артрите, эндометрите, метрите, мастите и других болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят крупному рогатому скоту внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл препарата на 50 кг массы тела животного (что соответствует 1 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного). При некробактериозе курс лечения длится 3 суток, при послеродовом эндометрите (метрите) – 5 суток (в первые 10 суток после отела), при заболеваниях респираторного тракта 3–5 суток.

Молодняку крупного рогатого скота, овцам и козам препарат вводят внутримышечно или подкожно в дозе 0,3 мл на 10 кг массы тела животного (что соответствует 1,5 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного), но не более 5 мл в одно место. Лечение проводят в течение 3–5 суток.

Свиньям препарат вводят внутримышечно из расчета 1 мл препарата на 16 кг массы тела животного (что соответствует 3 мг цефтиофура на 1 кг массы тела животного) в течение 3 суток.

Перед каждым использованием флакон с препаратом тщательно взбалтывают до получения однородной суспензии.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животного могут наблюдаться снижение аппетита, отечность в месте инъекции, исчезающая самопроизвольно.

13. Беременность и период лактации.

Особенности применения препарата самкам во время беременности и лактации не установлены.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске введения препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций (одышка, гиперемия, зуд, отечность). В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Препарат не следует назначать совместно с тетрациклинами, макролидами и линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими препаратами.

17. Форма выпуска.

Флаконы из бесцветного или темного стекла по 100 мл.

18. Срок годности.

18 месяцев с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона – 28 суток при соблюдении условий хранения.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 8 суток, свиней, овец и коз – не ранее чем через 5 суток после применения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Молоко от крупного и мелкого рогатого скота после применения препарата может быть использовано в пищевых целях без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 59 от 11.08.2026