СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 43 от 30.06.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Респирофлор-О 300»

1. Торговое наименование.
Респирофлор-О 300.

2. Международное непатентованное наименование.
Флорфеникол (florfenicol).

3. Регистрационный номер.
8350-10-22 БА.

4. Лекарственная форма и описание.
Суспензия для приема внутрь.
По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 300 мг флорфеникола, в качестве вспомогательных веществ – полисорбат 80, бензиловый спирт, микрокристаллическая целлюлоза, кармеллоза натрия, сорбитола раствор, симетикон, сахарин натрий, вода очищенная.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Амфениколы.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Флорфеникол, действующее вещество препарата, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus spp*., *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp*., *Staphylococcus spp*., *Streptococcus spp*., *Klebsiella spp*., *Proteus spp*.
Флорфеникол оказывает бактериостатическое действие на чувствительные к нему микроорганизмы. В протоплазме бактериальной клетки флорфеникол связывается с 70S рибосомальной субъединицей, блокирует фермент пептидилтрансферазу, что приводит к торможению синтеза белка на уровне рибосом.
При пероральном введении препарата флорфеникол хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани, но не преодолевает гематотканевых барьеров. Биодоступность флорфеникола после перорального введения составляет у свиней 88 %, у птицы – 55 %. Максимальная концентрация антибактериального средства в крови достигается через 1–2 часа. Терапевтическая концентрация антибактериального средства сохраняется в органах и тканях свиней и птицы в течение 24 часов. Из организма свиней флорфеникол преимущественно выводится с мочой и в меньшей степени с фекалиями. Из организма птицы флорфеникол выводится преимущественно с пометом.

8. Показания к применению.
Препарат применяют с лечебной целью свиньям при актинобациллярной плевропневмонии, гемофилезном полисерозите, бордетеллезе, пастереллезе, микоплазмозе, сальмонеллезе, эшерихиозе (колибактериозе) и других бактериальных инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.
Сельскохозяйственной птице – курам: бройлерам, племенной птице, птице родительского стада, ремонтному молодняку – при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, орнитобактериозе, стафилококкозе и других бактериальных инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным и птице с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата. Не применять животным с почечной и печеночной недостаточностью.

10. Способ применения и дозы.

Свиньям препарат применяют внутрь с питьевой водой в суточной дозе 5 мг флорфеникола на 1 кг массы тела животного, что соответствует 1 мл препарата на 60 кг массы тела животного, в течение 7 суток.

Птице препарат применяют внутрь в суточной дозе 20 мг флорфеникола на 1 кг массы тела птицы (1 мл препарата на 15 кг массы тела птицы), что соответствует около 0,5−1 л препарата на 3000 л питьевой воды, ежедневно в течение 3 суток, а при сальмонеллезе и смешанных инфекциях – в течение 5 суток.

Перед применением бутылку/канистру с препаратом следует взбалтывать.

Препарат допускается применять с использованием пульсдозинга.

В зависимости от режима выпаивания и настроек дозирующего оборудования допускается готовить как лечебный раствор, так и использовать маточную рабочую суспензию.

Для приготовления лечебного раствора необходимо разбавлять препарат в 300 и более раз, так как действующее вещество препарата флорфеникол растворяется в концентрации, не превышающей 1 г/л, т.е. при разбавлении 1 л препарата на 300 л питьевой воды.

Для приготовления маточной рабочей суспензии для последующего дозирования, растворения и выпаивания с помощью дозирующих устройств (пульсдозинг), допускается смешивать препарат с питьевой водой в любых пропорциях, например, 10 л препарата и 10 л воды, 2 л препарата и 50 л воды или в других соотношениях. При необходимости приготовленную маточную рабочую суспензию периодически (1 раз в течение 2−6 часов) перемешивают.

Приготовленный лечебный раствор или маточную рабочую суспензию следует применять сразу после приготовления и обновлять их каждые 24 часа в течение курса лечения. В период терапии животные и птица должны получать только воду, содержащую препарат. В случае, когда это невозможно, например, при использовании пульсдозинга, суточную дозу задают в течение не менее 4 часов или делят на 2 равные части и задают с интервалом 12 часов.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке у животных и птицы может наблюдаться диарея и отказ от корма и воды. У свиней перианальная эритема и отек. Указанные симптомы проходят самопроизвольно без назначения симптоматических средств.

13. Беременность и период лактации.

Препарат запрещается применять супоросным свиноматкам и свиноматкам в период лактации.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным и птице, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске приема препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

Запрещается применять препарат хрякам-производителям.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной

чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций (отечность, зуд, дерматит). В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается применять препарат одновременно с тиамфениколом, антибиотиками групп пенициллинов, цефалоспоринов, фторхинолонов.

17. Форма выпуска.

Полимерные бутылки по 1 л и канистры по 5 л.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия бутылки/канистры – 28 суток при соблюдении условий хранения. Приготовленный раствор годен в течение 24 часов.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток, птицы – не ранее чем через 2 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя животных и птицы ранее указанного срока мясо может быть использовано в корм плотоядным животным.

Запрещается применение препарата птице (в период яйценоскости), яйца которой предназначены в пищу людям, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адрес производственной площадки:

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/5; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 43 от 30.06.2026г