СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026г

# ИНСТРУКЦИЯ
## по применению ветеринарного лекарственного препарата «Рибонорм»

1. Торговое наименование.
Рибонорм.

2. Химическое наименование.
Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты.

3. Регистрационный номер.
8571-10-23 БПХ-Ф.

4. Лекарственная форма и описание.
Раствор для внутримышечного и подкожного введения.
По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

5. Состав.
В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 2 мг натриевой соли рибонуклеиновой кислоты, получаемой из *Saccharomyces cerevisiae*, в качестве вспомогательных веществ – натрия хлорид, натрия бензоат, динатрия эдетат, вода для инъекций.

6. Фармакотерапевтическая группа.
Иммуномодуляторы.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Натриевая соль рибонуклеиновой кислоты обладает широким спектром биологической активности, стимулирует гемопоэз, внутриклеточный метаболизм и нуклеиновый обмен, естественную резистентность (фагоцитарную активность, синтез интерферона, повышает содержание лизоцима, пропердина, β-лизина), Т- и В-системы иммунитета, антитоксическую резистентность организма животных, ускоряет процессы регенерации тканей.
Действующее вещество препарата снижает токсические иммуносупрессорные свойства антибиотиков, гормонов и сердечных гликозидов, предупреждает или уменьшает интенсивность аллергических реакций, повышает эффективность применения бактериальных и вирусных вакцин за счет повышения напряженности и продолжительности поствакцинального иммунитета.
В течение 10 суток рибонуклеиновая кислота оказывает действие в плазме крови с последующим выведением малых фрагментов почками, а больших фрагментов, которые могут быть связаны с белками, деградацией в печени с последующим выведением с фекалиями и мочой.

8. Показания к применению.
Препарат применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам, кошкам и пушным зверям в качестве иммуномодулирующего средства в комплексной терапии при инфекционных заболеваниях, развивающихся на фоне вторичных иммунодефицитных состояний, для коррекции лейкопении, лимфоцитопении и агранулоцитоза, повышения эффективности вакцинаций (при предварительном или одновременном применении с вакциной), а также при бактериальных осложнениях, для улучшения заживления ран и язв.
Препарат применяют также для предупреждения и снижения последствий стрессовых состояний у животных при транспортировке, в предоперационный и послеоперационный периоды, а также для лечения животных при незаразных болезнях в комплексе с другими лекарственными средствами.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят животным внутримышечно или подкожно в разовых дозах, указанных в таблице.

Вид животного и дозы препарата

| Вид животного | Возрастная группа животных и доза препарата (мл) | | |
|---|---|---|---|
| | молодняк до 3 месяцев | молодняк старше 3 месяцев | взрослые животные |
| Крупный рогатый скот | 1–3 | 3–5 | 5–6 |
| Свиньи | 0,5–1 | 1–2 | 2–4 |
| Собаки, кошки, пушные звери | 0,5–1 | 1–1,5 | 1–2 |

Для профилактики инфекционных заболеваний препарат назначают животным 2–3 раза в месяц через равные интервалы времени между введениями, а во время массовых заболеваний назначают 1 раз в сутки в течение 3–5 суток.

С лечебной целью препарат вводят животным один раз в сутки в течение 3–5 суток. При необходимости через 10–15 суток курс лечения повторяют.

При проведении предоперационной подготовки препарат вводят однократно, а в послеоперационный период – 2–5-кратно с интервалом 3–5 суток.

В начальной стадии заболеваний, при затруднении постановки точного диагноза, препарат назначают 2–3-кратно с интервалом 3–5 суток.

Для устранения последствий стрессовых состояний (при транспортировке, стрижке и т.п.) препарат применяют за 10–18 часов до стрессового воздействия.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

Симптомы передозировки при применении препарата у животных не выявлены.

13. Беременность и период лактации.

Особенности действия препарата на репродуктивную функцию животных, а также во время беременности и лактации не выявлены.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено. Следует избегать пропуска очередного применения препарата животным, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске введения препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Препарат можно применять совместно с витаминами, сыворотками, вакцинами и химиотерапевтическими средствами.

17. Форма выпуска.

Флаконы из темного стекла по 100 мл.

18. Срок годности.

1 год с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 8 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона – 14 суток при соблюдении условий хранения.

20. Условия отпуска.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Продукция животного происхождения после применения препарата может быть использована в пищевых целях без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатовая, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 33 от 26.05.2026г