

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Утеробэг»

1. Торговое наименование.

Утеробэг.

2. Международное непатентованное наименование.

Пропранолол (propranolol).

3. Регистрационный номер.

8400-10-23 БПХ-Ф.

4. Лекарственная форма и описание.

Раствор для внутривенного и внутримышечного введения.

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета.

5. Состав.

В 1 мл препарата в качестве действующего вещества содержится 5 мг пропранолола гидрохлорида, в качестве вспомогательных веществ – натрия цитрат, натрия метабисульфит, натрия хлорид, лимонная кислота, вода для инъекций.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Неселективные бета-адреноблокаторы.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Пропранолол, действующее вещество препарата, оказывает блокирующее действие на бета-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов.

Препарат усиливает спонтанные и вызванные утеротоническими средствами сокращения матки. Уменьшает маточное кровотечение при родах и в послеоперационном периоде.

Препарат хорошо всасывается из места инъекций и быстро распределяется по организму. Максимальная концентрация в крови достигается через 5–10 минут после введения препарата. Пропранолол проходит через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры. Метаболизируется препарат в печени, часть метаболитов обладает слабой бета-блокирующей активностью. Период полувыведения пропранолола составляет 3–5 часов. Время полного выведения – 12 часов. Выводится препарат из организма преимущественно с мочой и частично с фекалиями в виде метаболитов.

8. Показания к применению.

Препарат применяют коровам и свиноматкам для стимуляции родовой деятельности, профилактики послеродовых осложнений, при задержании последа, атонии и гипотонии матки, в схемах терапии при эндометрите (метрите) и субинволюции матки, при синдроме метрит-мастит-агалактия у свиноматок, для повышения оплодотворяемости, извлечения эмбрионов у коров-доноров.

9. Противопоказания.

Противопоказаниями к применению является индивидуальная непереносимость компонентов препарата, период беременности и патологическое расположение плода.

10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят внутримышечно или внутривенно.

В дозе 10 мл на 1 животное (50 мг пропранолола гидрохлорида на 1 животное) препарат применяют:

- коровам для стимуляции родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений однократно в день родов;
- при задержании последа у коров трехкратно с интервалом 12 часов;
- при субинволюции матки и эндометрите (метрите) у коров трехкратно с интервалом 24 часа в комплексе с другими препаратами.

В дозе 5 мл на 1 животное (25 мг пропранолола гидрохлорида на 1 животное) препарат применяют:

- для профилактики синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок однократно сразу после родов;
- при искусственном осеменении для повышения оплодотворяемости у коров и свиноматок однократно за 20–30 минут до процедуры;
- при извлечении эмбрионов у коров-доноров за 10–15 минут до вымывания.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

12. Передозировка.

При передозировке препарата у животных могут наблюдаться пониженная частота сердечных сокращений, гипотензия, бронхоспазм, мышечная слабость. При развитии выраженных побочных эффектов, особенно стойкой брадикардией, вследствие передозировки, применяют препараты атропина и бета-адреностимуляторы (изопреналин, орципреналин и другие) согласно их инструкциям по применению.

13. Беременность и период лактации.

Препарат противопоказан к применению в период беременности и при патологических родах (крупноплодие, уродства, аномалии развития). Лактирующим животным препарат применяют по показаниям с осторожностью, под наблюдением ветеринарного врача.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

При пропуске введения препарата курс применения необходимо возобновить как можно быстрее в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные и симптоматические лекарственные средства.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещено применение препарата одновременно с адреномimetиками, действующим веществом которых является ксилазин, так как пропранолол удлиняет действие недеполяризующих миорелаксантов. Седативные и снотворные препараты при одновременном применении с пропранололом усиливают угнетающее действие на ЦНС.

При внутривенном и внутримышечном введении йодсодержащих препаратов на фоне приема пропранолола повышается риск развития анафилактических реакций.

17. Форма выпуска.

Флаконы из темного стекла по 100 мл.

18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. После первого вскрытия флакона при внутримышечном введении – 14 суток при соблюдении условий хранения. При внутривенном введении препарат хранению после вскрытия не подлежит, допускается применять препарат для последующего внутримышечного введения.

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Продукцию, полученную от животных, которым применяли препарат, разрешается использовать в пищу без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 30 от 14.05.2026г