

## ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного лекарственного препарата «Утерофур»

1. Торговое наименование.

Утерофур.

2. Международное непатентованное наименование.

Цефтиофур (ceftiofur).

3. Регистрационный номер.

6838-10-19 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Суспензия для внутриматочного введения.

По внешнему виду препарат представляет собой суспензию от светло-желтого до коричневого цвета.

5. Состав.

В одном шприце (19 г) в качестве действующего вещества содержится 500 мг цефтиофура (в форме цефтиофура гидрохлорида), в качестве вспомогательных веществ – среднецепочечные триглицериды, макрогола цетостеариловый эфир 12, макрогола цетостеариловый эфир 20, гидрогенизированное касторовое масло.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Цефалоспорины.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Цефтиофур, входящий в состав препарата, является полусинтетическим цефалоспорином третьего поколения. Обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как *Treuerella (Arcanobacterium) pyogenes*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Bacteroides spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.* и других.

Механизм бактерицидного действия цефтиофура заключается в инактивации пенициллинсвязывающих белков, участвующих в синтезе основного биополимера клеточной стенки бактерий – пептидогликана, что препятствует сшивке пептидогликановых цепей, приводит к ослаблению клеточной стенки и лизису бактерий.

В полости матки цефтиофур быстро подвергается метаболизму с образованием десфуоилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении бактерий. Этот активный метаболит обратимо связывается с белками и накапливается в очаге инфекции, при этом его активность не снижается в присутствии некротизированных тканей. При внутриматочном применении абсорбируется менее 1 % препарата и системное действие практически не проявляется.

8. Показания к применению.

Препарат применяют для лечения коров, больных хроническим эндометритом, в том числе и со скрытой (субклинической) формой воспаления.

9. Противопоказания.

Противопоказано применение препарата животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, в том числе к цефалоспорином и другим бета-лактамам антибиотикам.

#### 10. Способ применения и дозы.

Препарат вводят однократно внутриматочно в дозе 19 г (один шприц).

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. Шприц соединяют с катетером, на руку надевают одноразовую перчатку и ректально фиксируют шейку матки, затем осторожно вводят катетер через шейку в полость матки и выдавливают содержимое шприца.

При необходимости введение препарата повторяют через 24 часа в той же дозе.

#### 11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

#### 12. Передозировка.

Симптомы передозировки при применении препарата у животных не выявлены.

#### 13. Беременность и период лактации.

Препарат может применяться в период лактации. Применение препарата стельным коровам возможно при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

#### 14. Особые указания.

Без особых указаний.

#### 15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. В случае возникновения аллергических реакций препарат отменяют и назначают антигистаминные средства и препараты кальция.

#### 16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается применение препарата совместно с антибиотиками групп тетрациклинов, макролидов и линкозамидов.

#### 17. Форма выпуска.

Пластиковые шприцы по 19 г, закрытые колпачками. Каждый шприц упаковывают в запаянный пакет вместе с катетером (пластиковой пипеткой) для внутриматочного введения и перчаткой для ректальной фиксации шейки матки.

#### 18. Срок годности.

2 года с даты производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

#### 19. Условия хранения.

В защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

#### 20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

#### 21. Условия уничтожения.

Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения.

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 48 часов после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным.

Молоко дойных коров разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

23. Правообладатель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

24. Производитель.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

Адреса производственных площадок:

Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org;

Республика Беларусь, Могилевская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Мира, 67/1; +375 2233 49080, info@belagrogen.org.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Агатова, 10; +375 17 3171414, info@belagrogen.org.

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный  
ветеринарный центр»

(Приказ Департамента ветеринарного  
и продовольственного надзора)

№ 61 от 18.08.2026